



65º Campeonato Nacional de Ornitologia 2010

ENTRONCAMENTO



SECÇÃO F 2 – OUTROS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4	FRINGILLIDAE (excluindo a fauna europeia)	Individual
F2-1	<ul style="list-style-type: none"> Serinos género <i>Serinus</i> Todos nas cores normais 	F2-2
F2-3	<ul style="list-style-type: none"> Lugres género <i>Carduelis</i> Todos nas cores normais 	F2-4
F2-5	<ul style="list-style-type: none"> Verdelhões, Pintassilgos, Pintarroxos, género <i>Carduelis</i> Papa-figos, género <i>Linurgus</i> Tentilhões de nuca dourada, género <i>Pyrrhoplectes</i> Todos nas cores normais 	F2-6
F2-7	<ul style="list-style-type: none"> Pintarroxos de sobrançelha vermelha, género <i>Callacanthis</i> Pintarroxos, géneros <i>Carpodacus</i> ou <i>Leucosticte</i> Bicos-grossudos, género <i>Pinicola</i> Todos nas cores normais 	F2-8
F2-9	<ul style="list-style-type: none"> Dom-fafes, género <i>Pyrrhula</i> Pintarroxos do deserto, Trompeteiros, ou de asa carmesim, género <i>Rhodopechys</i> Pintarroxos, géneros <i>Uragus</i> ou <i>Urocynchramus</i> Todos nas cores normais 	F2-10
F2-11	<ul style="list-style-type: none"> Bicos-grossudos, géneros <i>Eophona</i>, <i>Hesperiphona</i>, <i>Mycerobas</i>, <i>Neospiza</i> ou <i>Rynchostruthus</i> Tentilhões azuis, género <i>Fringilla</i> Tentilhões escarlata, género <i>Haematoaspiza</i> Todos nas cores normais 	F2-12
F2-13	<ul style="list-style-type: none"> Mutações das Classes 1, 3, 5, 7, 9, 11 	
	<ul style="list-style-type: none"> Mutações das Classes 2, 4, 6, 8, 10, 12 	F2-14
Equipa de 4	EMBERIZIDAE (apenas granívoros) (Restantes incluídos nas classes de Frugívoros e Insectívoros)	Individual
F2-15	<ul style="list-style-type: none"> Pardais, géneros <i>Aimophila</i>, <i>Ammodramus</i>, <i>Anthispiza</i>, <i>Arremon</i>, <i>Arremonops</i>, <i>Calcarius</i>, <i>Chondestes</i>, <i>Melospiza</i>, <i>Melozone</i>, <i>Oriturus</i>, <i>Pezopetes</i>, <i>Poocetes</i>, <i>Pselliophorus</i>, <i>Spizella</i>, <i>Torreornis</i> ou <i>Zonotrichia</i> Tentilhões americanos, géneros <i>Calamospiza</i>, <i>Emberiza</i>, <i>Passerina</i> ou <i>Plectrophenax</i>; género <i>Atlapetes</i> Juncos, género <i>Junco</i>; género <i>Lysurus</i> Pipilos, género <i>Pipilo</i> Botões-de-ouro, género <i>Sicalis</i> Todos nas cores normais 	F2-16
F2-17	<ul style="list-style-type: none"> Galinhas da serra ou Tico-ticos, género <i>Coryphospingus</i> Cardeais pigmeu, género <i>Lophospingus</i>; género 	F2-18

	<p><i>Loxigilla</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Granívoros, géneros <i>Oryzoborus</i> ou <i>Sporophila</i> • Cantores, género <i>Tiaris</i> • Jacarinis, género <i>Volatinia</i> <p>Todos nas cores normais</p>	
F2-19	<ul style="list-style-type: none"> • Cardeais, géneros <i>Cardinalis</i>, <i>Gubernatrix</i>, <i>Paroaria</i> ou <i>Pyrhuloxia</i> • Bicos-grossudos, géneros <i>Guiraca</i> ou <i>Pheucticus</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-20
F2-21	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 15, 17, 19 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 16, 18, 20 	F2-22
Equipa de 4	PASSERIDAE, PLOCEIDAE	Individual
F2-23	<ul style="list-style-type: none"> • Tecelões, géneros <i>Euplectes</i>, <i>Foudia</i>, <i>Ploceus</i> ou <i>Quelea</i> • Pardais das neves, género <i>Montifringilla</i> • Pardais, género <i>Passer</i> ou <i>Petronia</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-24
F2-25	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações da classe 23 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações da classe 24 	F2-26
Equipa de 4	ESTRILDIDAE	Individual
F2-27	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Twin-spots</i> castanhos, género <i>Clytospiza</i> • <i>Twin-spots</i> de dorso verde, género <i>Mandingoa</i> • <i>Pitilias</i>, género <i>Pytilia</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-28
F2-29	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Twin-spots</i>, géneros <i>Euschistospiza</i> ou <i>Hypargos</i> • Tecelões, género <i>Parmoptila</i> • Pirinestes, género <i>Pyrenestes</i> • Bicos-azuis, género <i>Spermophaga</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-30
F2-31	<ul style="list-style-type: none"> • Peitos de fogo, género <i>Lagonosticta</i> • Negritos, género <i>Nigrita</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-32
F2-33	<ul style="list-style-type: none"> • Bicos de lacre, género <i>Estrilda</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-34
F2-35	<ul style="list-style-type: none"> • Amandavas, género <i>Amandava</i> • Asas carmesim, género <i>Cryptospiza</i> • Dorsos oliva, género <i>Nesocharis</i> • Diamantes codorniz, género <i>Ortygospiza</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-36
F2-37	<ul style="list-style-type: none"> • Peitos-celeste ou Granadeiros, género <i>Uraeginthus</i> <p>Todos nas cores normais</p>	F2-38
F2-39	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 27, 29, 31, 33, 35, 37 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Mutações das classes 28, 30, 32, 34, 36, 38 	F2-40
F2-41	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) ancestral 	F2-42
F2-43	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado (<i>Amadina fasciata</i>) mutações 	F2-44
F2-45	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) ancestral 	F2-46
F2-47	<ul style="list-style-type: none"> • Degolado de cabeça vermelha (<i>Amadina erythrocephala</i>) mutações 	F2-48
F2-49	<ul style="list-style-type: none"> • Bico de prata (<i>Lonchura cantans</i>) ancestral 	F2-50

F2-51	• Bico de prata (<i>Lonchura cantans</i>) mutações	F2-52
F2-53	• Bico de chumbo (<i>Lonchura malabarica</i>) ancestral	F2-54
F2-55	• Bico de chumbo (<i>Lonchura malabarica</i>) mutações	F2-56
F2-57	• Bico de prata de cabeça cinzenta (<i>Lonchura griseicapilla</i>) ancestral	F2-58
F2-59	• Freirinha-branca-e-preta (<i>Lonchura bicolor</i>) • Freirinha-bronze (<i>L. cucullata</i>) • Freirinha-pêga (<i>L. fringilloides</i>) • Bico de prata de Madagáscar (<i>L. nana</i>) Todos nas cores normais	F2-60
F2-61	• Capuchinho de cabeça cinzenta (<i>Lonch. caniceps</i>) • Capuchinho de uropígio amarelo (<i>L. flaviprymna</i>) • Capuchinho da Nova Irlanda (<i>L. forbesi</i>) • Capuchinho de bico grande (<i>L. grandis</i>) • Capuchinho de Hunstein (<i>L. hunsteini</i>) • Capuchinho de cabeça branca (<i>L. maja</i>) • Capuchinho castanhos (<i>L. malacca</i>) • Capuchinho de bico grosso (<i>L. melaena</i>) • Capuchinho das Molucas (<i>L. molucca</i>) • Capuchinho das montanhas (<i>L. montana</i>) • Capuchinho alpinos (<i>L. monticola</i>) • Capuchinho de coroa cinzenta (<i>L. nevermanni</i>) • Capuchinho de cabeça pálida (<i>L. pallida</i>) • Capuchinho dominó (<i>L. punctulata</i>) • Capuchinho da Nova Inglaterra (<i>L. spectabilis</i>) • Capuchinho de uropígio branco (<i>L. striata</i>) • Capuchinho preto (<i>L. stygia</i>) • Capuchinho do Grande Vale (<i>L. teerinki</i>) • Capuchinho de banda cinzenta (<i>L. vana</i>) Todos nas cores normais	F2-62
F2-63	• Capuchinho de peito castanho (<i>L. castaneothorax</i>) • Capuchinho fusco (<i>L. fuscans</i>) • Capuchinho de ventre ruivo (<i>L. kelaarti</i>) • Capuchinho de barriga branca (<i>L. leucogastra</i>) • Capuchinho de Java (<i>L. leucogastroides</i>) • Capuchinho de pontos brancos (<i>L. leucosticta</i>) • Capuchinho de peito pintado (<i>L. pectoralis</i>) • Capuchinho castanho e branco (<i>L. quinticolor</i>) • Capuchinho de cabeça estriada (<i>L. tristissima</i>) • Pardal de Timor (<i>Padda fuscata</i>) Todos nas cores normais	F2-64
F2-65	• Mutações das classes 57, 59, 61, 63	
	• Mutações das classes 58, 60, 62, 64	F2-66
F2-67	• Diamantes papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) ancestral	F2-68
F2-69	• Diamantes papagaio (<i>Erythrura psittacea</i>) mutações	F2-70
F2-71	• Diamantes de Kitlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) ancestral	F2-72
F2-73	• Diamantes de Kitlitz (tricolor) (<i>Erythrura trichroa</i>) mutações	F2-74
F2-75	• Outros diamantes género <i>Erythrura</i> Todos nas cores normais	F2-76
F2-77	• Caudas de fogo, género <i>Emblema</i> • Outros diamantes, género <i>Neochmia</i> ou <i>Aegintha</i> • Diamantes das montanhas, género <i>Oreostruthus</i> Todos nas cores normais	F2-78
F2-79	• Diamante Bichenov (<i>Poephila Bichenovii</i>) ancestral	F2-80

F2-81	• Diamante Mascarado (<i>Poephila personata</i>) ancestral	F2-82
F2-83	• Outros diamantes, género <i>Aidemosyne</i> • Outros diamantes australianos, género <i>Poephila</i> Todos nas cores normais	F2-84
F2-85	• Viúvas género <i>Vidua</i> Todos nas cores normais	F2-86
F2-87	• Mutações das classes 75, 77, 79, 81, 83, 85	
	• Mutações das classes 76, 78, 80, 82, 84, 86	F2-88
Equipa de 4	FRUGÍVOROS, INSECTÍVOROS, NECTARÍVOROS (Este grupo inclui espécies pertencentes a famílias de classes precedentes, mas foi estabelecido pela especificidade do seu regime alimentar principal)	Individual
F2-89	• Bulbuls (<i>Pycnonotidae</i>) • Mainates, Pica-bois, Estorninhos (<i>Sturnidae</i>) • Piscos, Tordos (<i>Turdidae</i>) Todos nas cores normais	F2-90
F2-91	• Gralhas, Gaios, Pêgas (<i>Corvidae</i>) • Tordos ou Gaios Garrulax (<i>Timalidae</i>) • Papa-moscas tirano (<i>Tyrannidae</i>) Todos nas cores normais	F2-92
F2-93	• Papa-moscas do Velho Mundo (<i>Muscicapidae</i>) • Chapins verdadeiros (<i>Paridae</i>) • Tangarás, Dançadores, Rendeiras (<i>Pipridae</i>) • Tordos gaio, Rouxinóis do Japão, Messias orelha de prata, Minlas, Síbias, Luinas (<i>Timaliidae</i>) • Zosteropes de óculos brancos (<i>Zosteropidae</i>) Todos nas cores normais	F2-94
F2-95	• Pássaros rateiros (<i>Coliidae</i>) • Cotingas, Arapongas (<i>Cotingidae</i>) • Bicos-largos (<i>Eurylaimidae</i>) • Turacos (<i>Musophagidae</i>) • Araçarís, Tucanetes, Tucanos (<i>Ramphastidae</i>) • Quetzals, Surucuás (<i>Trogonidae</i>) Todos nas cores normais	F2-96
F2-97	• Martins pescador (<i>Alcedinidae</i>) • Minivetes (<i>Campephagidae</i>) • Barbetes ou Capitães de bigode (<i>Capitonidae</i>) • Rolieiros (<i>Coraciidae</i>) • Arirambas (<i>Galbulidae</i>) • Pássaros pretos, Tristes-pia, Xéxéus, Gaudérios, Sargentos, Garibaldis, Caretões, Estornelas, Oropêndolas ou Japús (<i>Icteridae</i>) • Pássaros azuis (<i>Irenidae</i>) • Abelharucos (<i>Meropidae</i>) • Udu ou Juruvas (<i>Momotidae</i>) • Papa-figos (<i>Oriolidae</i>) • Pica-paus e Pica-paus anões (<i>Picidae</i>) • Juruviaras, Vite-vites (<i>Vireonidae</i>) Todos nas cores normais	F2-98
F2-99	• Clorofónias e.g Bonito do campo, Gaturamos, Fi-fis, Sais, Sairas e Tangarás (<i>Emberezidae</i>) • Felosas (<i>Parulidae</i>) Todos nas cores normais	F2-100
F2-101	• Sais de perna amarela (<i>Emberezidae</i>) • Pássaros de sol ou Nectarinos (<i>Nectariniidae</i>) • Colibrís (<i>Trochilidae</i>) Todos nas cores normais	F2-102

F2-103	• Mutações das classes 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93	
	• Mutações das classes 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94	F2-104
F2-105	• Outras espécies não incluídas nas classes 1 a 95 (equipa de 4)	
	• Outras espécies não incluídas nas classes 2 a 96 (individual)	F2-106