



## 65º Campeonato Nacional de Ornitologia 2010

### ENTRONCAMENTO



#### SECÇÃO O – ROLAS E POMBOS EXÓTICOS – C.P. (anilhas de 1 e/ou 2 anos)

Equipa de 4	<b>ROLAS E POMBOS EXÓTICOS</b> <b>Observações: Não são aceites aves VARIEGADAS (malhadas) nas secções O e P</b>	Individual
O-1	Rola Plácida ( <i>Geopelia placida</i> ) Rola de Maugé ( <i>G. maugaeus</i> ) Rola Zebrada ( <i>G. striata</i> ) Rola Humeral ( <i>G. humeralis</i> ) Rola Máscara de Ferro ( <i>Oena capensis</i> ) Nas cores clássicas	O-2
O-3	Rola Diamante ( <i>G. cuneata</i> ) e suas mutações	O-4
O-5	Rola dos bosques ( <i>Streptopelia turtur</i> ) Rolas de peito rosa ( <i>S. lugens</i> ) Rola oriental ( <i>S. orientalis</i> ) Rola malhada do Senegal ( <i>S. senegalensis</i> ) Rola da China ( <i>S. chinensis</i> ) Rola chorosa ( <i>S. decipens</i> ) Rola vinácea ( <i>S. vinacea</i> ) Rola do Cabo ( <i>S. capicola</i> ) Rola birmana ( <i>S. tranquebarica</i> ) Rola de colar de olho vermelho ( <i>S. semitorquata</i> ) Rola turca ( <i>S. decaoto</i> ) Rola de Reichenow ( <i>S. reichenovii</i> ) Rola de colar duplo ( <i>S. bitorquata</i> ) Rola de Amadoa ( <i>S. hypopyrrha</i> ) Rola da Abissínia ( <i>Turtur abyssinicus</i> ) Rola esmeralda ( <i>T. chalcospilos</i> ) Rola africana ( <i>T. afer</i> ) Rola tamborete ( <i>T. tympanistrria</i> ) Rola menina ( <i>T. brehmeri</i> ) Rola triste ( <i>Zenaida macroura</i> ) Rola de Galápagos ( <i>Z. galapagoensis</i> ), etc. Todas nas cores clássicas	O-6
O-7	Rola risonha ( <i>S. roseigrisrria</i> ) e suas mutações	O-8
O-9	Rola escamada ( <i>Columbina squamata</i> ) Rola inca ( <i>C. inca</i> ) Rola picui ( <i>C. picui</i> ) Rola de banda grená ( <i>C. cruziana</i> ) Rola minuto ( <i>C. minuta</i> ) Rola passarinho ( <i>C. passerina</i> ) Pomba de Bucklei ( <i>C. buckleyi</i> ) Rola talpacote ( <i>C. talpacoti</i> ) Rola azulada ( <i>Claravis pretiosa</i> ) Rola de Grenada ( <i>Leptotila wellsi</i> ) Rola da Jamaica ( <i>L. jamaicensis</i> ) géneros <i>Metriopelia</i> , <i>Uropelia</i> e <i>Starmoenas</i> todas de cor clássica	O-10

O-11	<p>Pomba apunhalada (<u>Gallicolumba</u> Luzonica)</p> <p>Pomba de peito dourado (Gal. Rufigula)</p> <p>Rola tristigmata (Gal. Tristigmata)</p> <p>Pomba de Bartlett (Gal. Criniger)</p> <p>Pomba de Jobi (Gal. Jobiensis)</p> <p>Pomba de Palau (Gal. Canifrons)</p> <p>Pomba de Stair (Gal. Stairi)</p> <p>Pomba de bochechas brancas (<u>Geotrygon</u> Chrysia)</p> <p>pombo vermelha das montanhas (Geo. Montana)</p> <p>Pomba versicolor (Geo. Versicolor)</p> <p>Pomba de bigodes (Geo. Mystacea), etc.</p> <p>todas nas cores clássicas</p>	O-12
O-13	<p>Rola asa de bronze (<u>Phaps</u> chalconotus)</p> <p>Rola arlequim (Ph. histrionica)</p> <p>Rola elegante (Ph. elegans)</p> <p>Rola da Índia (<u>Chalcophaps</u> indica)</p> <p>Rola plumifera (C. plumifera)</p> <p>Rola lofote (C. Lophote)</p> <p>Rola de cauda de barras (<u>Macropygia</u> onchal)</p> <p>géneros <u>Henicophaps</u>, <u>Petrophassa</u>, <u>Reiwardtoena</u> e <u>Turacoena</u></p> <p>todas nas cores clássicas</p>	O-14
O-15	<p>Pomba tigrada (<u>Columba</u> maculosa)</p> <p>Pomba de coroa branca (C. leucocephala)</p> <p>Pomba galega (C. cayenensis)</p> <p>Pomba do Perú (C. oenops)</p> <p>Pomba da Guiné (C. guinea)</p> <p>Pombo-bravo (C. oenas)</p> <p>Pomba da rocha (C. livia)</p> <p>pombo torcaz (C. palumbus)</p> <p>Pomba cinzenta (C. pulchricollis)</p> <p>Pombinha de Wonga (<u>Leucosarcia</u> melanoleuca), etc.</p> <p>todas nas cores clássicas</p>	O-16
O-17	<p>Pomba soberba da fruta (<u>Ptilinopus</u> superbus)</p> <p>Pomba da fruta de fronte laranja (P. aurantifrons)</p> <p>Pomba de Nicobar (<u>Caloenas</u> nicobarica)</p> <p>géneros <u>Treron</u> e outros <u>não contemplados nas classes 1 a 12</u></p> <p>todas nas cores clássicas</p>	O-18
O-19	Mutações de todas as espécies das classes 1 a 17, excepto 3 e 7	O-20
O-21	novas mutações em estudo (sem prémio)	O-22